



Engerling des Junikäfers

Allgemeines

Engerlinge des Junikäfers schädigen den Rasen und manchmal auch Wiesen durch Frass an den Pflanzenwurzeln. Dadurch verfärbt sich der Rasen im Sommer gelblich und kann wie ein Teppich abgehoben werden. Dazu kommen Schäden durch Krähen, Igel, Dachse und Wildschweine, die nach den Engerlingen graben, um sie zu fressen.


Auftreten

Der Junikäfer kommt im Mittelland vor und schädigt Rasenpflanzen. Der Schwarmflug findet immer in der Abenddämmerung um den 21. Juni herum statt. Der Junikäfer ist ein ungeschickter Flieger.

Zyklus

Der Junikäfer entwickelt sich innerhalb zwei Jahren vom Ei zum Käfer. Nur die Larvenstadien sind bekämpfbar.

Entwicklungszyklus Junikäfer und Bekämpfungszeitraum



Wann	Was
März bis Juli	Einsatz von 5 g / m ² GranMet (Metarizium Pilz auf sterilisierten Gerstenkörnern)
Um den 21. Juni	Schwarmflug des Käfers, immer in der Dämmerung
August	Witterung zu trocken für die Bekämpfung
September	Ausbringen der GranMet -Körner nach dem Aerifizieren. Die Körner werden zusammen mit 3 bis 5 l / m ² UFA-Rasenerde eingeschleppt.

Wichtig: Genügend Bodenfeuchtigkeit ist Voraussetzung für den Behandlungserfolg. **Bei Trockenheit unbedingt bewässern!**



Erwachsener Junikäfer; karamellfarbener, ungeschickter Flieger in der Abenddämmerung

Larve Junikäfer; gross und fett, vorne verdickt, krabbelt auf glatter Unterlage auf den Beinen.












Kontakt: Trüb für Grün AG, Felix Glättli, 076 575 00 71



Steckbrief Blatthornkäfer –

Details zur besseren Unterscheidung

	Maikäfer	Gartenlaubkäfer	Junikäfer
Bild Käfer			
Kennzeichen	Weisse Dreiecke auf den Seiten	Metallisch-grüner Halsschild	Karamellfarben, behaart, ungeschickter Flieger
Grösse	25-30 mm	8-10 mm	15-19 mm
Flug	Ab Ende April, ca. Löwenzahnblüte, Ganztags	Ab Ende Mai bis Mitte Juni, Vormittags	Um den 21. Juni, in der Dämmerung
Bild Larve			
Fortbewegung auf glatter Unterlage	Seitlich	Auf den Beinen	Auf den Beinen
Bild Analfalte Larve			
Beschreibung Analfalte	Dreitagebart mit Strich	Smiley	Mercedes-Stern
Zyklus	3 Jahre	Jahr	2 Jahre
Grösse	Jahr 1: 10-20 mm Jahr 2: 30-35 mm Jahr 3: 40-50 mm	10-20 mm	10-30 mm
Schaden	Wurzelfrass Rasenpflanzen	Wurzelfrass Rasenpflanzen	Wurzelfrass Rasenpflanzen
Bekämpfung	Melocont	Nemagreen, GranMet	GranMet
Termin Bekämpfung	Pilz: März-Juli, Sept.	Nematoden: Aug., Sept., Pilz: März-Juli, Sept.	Pilz: März-Juli, Sept.